

젬시타빈 성분 제제 허가사항 변경(안)

'4. 이상반응' 항

1)~9) <생략>

10) 기타

(1)~(4) <생략>

(5) 피부 및 주사부위: 이 약을 투여 받은 환자의 4 %에서 주사부위의 관외침출사례가 보고되었다.

주사부위 괴사는 보고되지 않았다. 드물게 봉소염과 혈관외 출혈을 동반하지 않는 중대하지 않은 주사부위 반응이 보고되었다. 매우 드물게 박리, 수포성 피부발진, 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 고사 용해(TEN) 및 빈도불명의 급성 전신 피진성 농포증(AGEP)을 포함하는 중증의 피부반응과 두드러기, 주사부위반응(정맥염, 통증, 홍반), 심각한 피부장애 (홍반, 수포 등), 가성 봉와직염이 보고되었다.

(6)~(8) <생략>

11)~14) <생략>

5. '일반적 주의'항

1)~13) <생략>

14) 젬시타빈 치료 관련하여 위중하거나 치명적일 수 있는 증증 피부 이상 반응(SCARs)

(스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 고사 용해(TEN), 급성 전신 피진성 농포증(AGEP) 포함)이 보고되었다. 환자에게 증상 및 징후에 대해 알리고, 환자의 피부 반응 발현 여부를 면밀히 모니터링한다. 또한 이러한 반응을 암시하는 증상 및 징후가 발생할 경우 젬시타빈 투여를 즉시 중단해야 한다.

젬시타빈 성분 제제 허가사항 변경대비표(안)

항목	기허가 사항	변경(안)
4. 이상 반응	<p>1)~9) <생략></p> <p>10) 기타</p> <p>(1)~(4) <생략></p> <p>(5) <u>피부 및 주사부위:이 약을 투여 받은 환자의 4 %에서 주사부위의 관외침출 사례가 보고되었다.</u> 주사부위 고사는 보고되지 않았다. 드물게 봉소염과 혈관외 출혈을 동반하지 않는 중대하지 않은 주사부위 반응이 보고되었다. 매우 드물게 <u>박리와 수포성 피부발진을 <신설></u> 포함하는 중증의 <u>피부반응</u>이 보고되었다. 두드러기, 주사부위반응(정맥염, 통증, 홍반), 심각한 피부장애(홍반, 수포 등), 가성 봉와직염이 보고되었다.</p> <p>(6)~(8) <생략></p> <p>11)~14) <생략></p>	<p>1)~9) <생략></p> <p>10) 기타</p> <p>(1)~(4) <생략></p> <p>(5) <u>피부 및 주사부위: 이 약을 투여 받은 환자의 4 %에서 주사부위의 관외침출사례가 보고되었다.</u> 주사부위 고사는 보고되지 않았다. 드물게 봉소염과 혈관외 출혈을 동반하지 않는 중대하지 않은 주사부위 반응이 보고되었다. 매우 드물게 <u>박리, 수포성 피부발진, 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 고사 용해(TEN) 및 빈도불명의 급성 전신 피진성 농포증(AGEP)</u>을 포함하는 중증의 <u>피부반응과</u> 두드러기, 주사부위반응(정맥염, 통증, 홍반), 심각한 피부장애(홍반, 수포 등), 가성 봉와직염이 보고되었다.</p> <p>(6)~(8) <생략></p> <p>11)~14) <생략></p>
5. 일반적 주의	<p>1)~13) <생략></p> <p><u><신설></u></p>	<p>1)~13) <생략></p> <p><u>14) 젬시타빈 치료 관련하여 위중하거나 치명적일 수 있는 중증 피부 이상 반응(SCARs)(스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 고사 용해(TEN), 급성 전신 피진성 농포증(AGEP) 포함)이 보고되었다.</u> 환자에게 증상 및 징후에 대해 알리고, 환자의 피부 반응 발현 여부를 면밀히 모니터링한다. 또한 이러한 반응을 암시하는 증상 및 징후가 발생할 경우 젬시타빈 투여를 즉시 중단해야 한다.</p>