

최초품목허가일: 2006.01.03

최종변경허가일: 2014.12.05

일반의약품



[원료약품의 분량]

1정 (127 mg) 중,

- 유효성분: 벤프로페린인산염 (벤프로페린으로서 20 mg에 해당) (KP) 26.4 mg
- 첨가제: 경질무수규산, 메타아크릴산디메틸아미노에틸·메타아크릴산 메틸공중합체, 산화티탄, 스테아르산마그네슘염, 유당수화물, 인산수소칼슘, 지방유, 카르나우바납, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탤크, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스 2910

[성상]

흰색의 원형 필름코팅정

[효능·효과]

주 효능·효과

다음 질환에서의 기침: 감기, 급·慢성 기관지염, 상기도염 (인후두염), 폐결핵

[용법·용량]

성인: 벤프로페린으로서 1회 20-40 mg 1일 3회 경구투여 한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

최초품목허가일: 2006.01.03

최종변경허가일: 2014.12.05

1) 이 약에 과민증 환자

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 피로, 불쾌감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 복통, 위부불쾌감, 가슴쓰림, 구갈 등이 나타날 수 있다.
- 3) 과민증 : 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하여야 한다.

3. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형 발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

4. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하여야 한다

5. 적용상의 주의

정제를 구강내에서 씹으면 구강점막에 마취 효과를 나타낼 수 있으므로 그대로 삼켜야 한다.

【포장단위】

100 정/블리스터

최초품목허가일: 2006.01.03

최종변경허가일: 2014.12.05

500 정/병

[저장방법]

기밀용기, 실온(1-30°C)보관

[사용기간]

제조일로부터 36 개월

[제조자]

Pfizer Pharmaceuticals Ltd.

22 Daqing Road, Economic Technical Development Zone, Dalian, Liaoning, China

수입자:

한국화이자제약

서울특별시 중구 퇴계로 110